


Periferno vstavljen centralni kateter

T.i. "PICC" pomeni periferno vstavljen centralni kateter (angl. **p**eripherally **i**nserted **c**entral **c**atheter). Kateter je dolga, tanka, upogljiva cevka.

PICC je vstavljen preko žile (vene) na vaši roki, njegova konica ob pravilni legi leži v centralnih venah v prsih, najpogosteje zgornji veliki žili odvodnici (t.i. zgornja vena kava).

S PICC je omogočen kratko- ali srednjeročen dostop do venskega sistema preko katerega boste lahko prejeli zdravila in ostale infuzije.



Primer PICC

Kakšne koristi bom imel od posega?

Postavitev PICC je razmeroma preprost poseg z zelo malo možnimi zapleti. Po pravilni postavitvi je varen in učinkovit način za aplikacijo intravenskih zdravil. Ker je lahko vstavljen več mesecev, se s tem izognete večkratnim zbadanjem. Prav tako so lahko nekatera zdravila potencialno škodljiva za manjše periferne žile na rokah, s postavitvijo PICC pa se izognemo njihovim morebitnim poškodbam.

Kako se lahko pripravim na poseg?

Zdravniku morate pred posredovati seznam zdravil, ki jih prejimate. Nekateri boste morda morali pred posegom prenehati jemati, ali zmanjšati njihov odmerek. Zdravnika morate opozoriti, če ste ali obstaja možnost, da ste noseči in/ali če imate znane alergije. V nekaterih primerih bo pred posegom potreben odvzem krvi.

Poseg

Poseg bo opravljen na oddelku za interventno radiologijo. Med posegom boste ležali, priključeni boste na aparature za merjenje srčne frekvence in krvnega tlaka. PICC je lahko vstavljen skozi levo ali desno roko, ki jo boste med posegom imeli iztegnjeno na preiskovalni mizi. Interventni radiolog si bo z ultrazvokom pomagal najti najustreznejšo žilo za pristop.

Kožo na roki vam bodo razkužili in prekrili s sterilnimi pokrivali. S pomočjo ultrazvoka bo zdravnik določil žilo, v katero bo vstavil PICC. Pred vbodom bo pod kožo vbrizgal lokalni anestetik, pri čemer boste še čutili bolečino, kasneje boste čutili le pritisk.

S pomočjo rentgenskega aparata bo zdravnik skozi žilo uvedel PICC na ustrezen položaj. Po postavitvi katetra ga bo prebrizgal s fiziološko raztopino in preveril njegovo delovanje.

Mesto na koži bo zavaroval z obližem.

Kakšna so tveganja posega?

Poseg ima razmeroma nizko stopnjo zapletov. Predvsem pri dolgotrajno vstavljenem PICC (2 meseca in več), je možno draženje žile in posledično vnetje.

Povečano je tveganje za nastanek strdkov in zamašitev žile.


Zamašitev PICC je najpogostejši zaplet, ki ga je mogoče preprečiti z rednim izpiranjem ali menjavo z novim. Pomembno je slediti navodilom za nego PICC, da se izognemo poškodbam katetra.

Kaj lahko pričakujem po posegu? Kako bo potekalo sledenje?

Večina bolnikov lahko kmalu po posegu zapusti bolnišnico.

Pred odpustom boste prejeli navodila:

- vbodno mesto naj bo čisto, suho in pokrito s povojem;
- tedensko naj se zamenja preveza, če se umaže prej;
- izogibajte se dvigovaju ali drugim manevrom, pri katerih bi se lahko PICC iztaknil;
- za izpiranje PICC, če bo to potrebno.



Pravilna lega PICC

www.cirse.org/patients

Ta dokument vsebuje splošne zdravstvene informacije. Informacije niso namenjene kot nadomestilo za strokovno zdravniško svetovanje, diagnozo ali zdravljenje.