


## Периферно поставен централен венски катетер - PICC

**PICC** (peripherally inserted central catheter) претставува тенок, свитливо цефче (катетер) кое се пласира преку периферна вена на раката и води сè до централна вена во градниот кош. PICC служи како краткотраен централен венски пристап за аплицирање лекови и течности.



Пример за PICC

### Која е придобивката од оваа процедура?

Поставувањето PICC е релативно кратка и едноставна процедура со многу малку потенцијални компликации. Главниот бенефит од овој катетер е тоа што ќе ги избегнете постојаните боцкања на вените на рацете, било за интравенски инјекции или поставување канила. Овој катетер овозможува централен венски пристап за аплицирање лекови, течности, земање крв и може да се користи 2-3 месеци.

### Како да се подготвите за оваа процедура?

Потребно е да сте гладни пред оваа процедура (тоа значи да не сте јаделе во последните 6-8 часа). Известете го лекарот доколку земате каква било редовна терапија, бидејќи некои лекови треба да се прекинат претходно, особено лекови што влијаат на коагулацијата на крвта.

### Опис на процедурата

Оваа интервенција се изведува во одделот за интервентна радиологија. Вообичаено, процедурата се изведува со локална анестезија. Локалниот анестетик се користи за привремено да се намали осетливоста на кожата и да не чувствувате болка, но понекогаш може да се додадат лекови за блага седација. Генерално, самата процедурата трае околу 30 минути.


Катетерот се поставува во пределот на лактот или надлактицата од левата/десната рака, каде се прави стерилна подготовка на кожата. Со помош на ултразвук се верифицира најпогодна вена за пункција. Најпрво се аплицира локален анестетик на одреденото место и се пунктира вената.

Потоа мала жица се пласира до поголема вена во градниот кош, преку која се поставува катетерот до посакуваната позиција под краткотрајно водство на рендгенски зраци (флуороскопија), а потоа жицата се отстранува. Откако ќе се потврди соодветната позиција и функционалноста на катетерот, истиот се прицврстува за кожата на раката со специјална просирна лепенка.

## Кои се ризиците?

Компликациите кај PICC катетрите се ретки. Постои можност вената низ која е пласиран катетерот да се иритира, и притоа да настане инфламација. Ризикот за ова е поголем доколку катетерот остане долго (повеќе од 2 до 3 месеци).

Тромбозирање или затнување на катетерот е најчеста компликација, која може да се превенира со соодветна употреба на катетерот односно со редовно пропирање и тоалета.



Поставен PICC катетер

## Што да очекувате после процедурата?

### Каков е планот за следење?

Станува збор за амбулантска процедура, тоа значи дека набрзо по завршување на процедурата можете да ја напуштите болницата.

Доколку сте примиле блага седација, можете да јадете по 1 до 2 часа. На раката на местото на поставување на катетерот може да чувствувате нелагодност, или да имате мала модринка, но сето тоа е очекувано и привремено.

Ќе добиете детални инструкции од медицинскиот персонал за тоа што треба да правите и како да одржувате правилна тоалета на местото каде е поставен катетерот. Потребно е да внимавате и да не ја оптоварувате раката каде е поставен катетерот. Кога ординирачкиот лекар ќе смета дека катетерот веќе не е потребен, истиот се отстранува.

## [www.cirse.org/patients](http://www.cirse.org/patients)

*This document contains general medical information. The information is not intended or implied to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment.*