


Catetere venoase centrale cu inserție periferică (PICC)

PICC înseamnă cateter central introdus periferic. Acestea sunt tuburi (catetere) lungi, subțiri și flexibile care sunt introduse într-o venă din brațul dumneavoastră (periferic) și trecute în venele centrale din torace. Un PICC oferă acces pe termen scurt și mediu la sistemul venos pentru administrarea de medicamente și fluide medicale.



Exemplu de PICC

Cum mă va ajuta procedura?

Plasarea unui PICC este o procedură relativ simplă, cu foarte puține complicații potențiale. Odată plasat, un PICC reprezintă o modalitate sigură, stabilă și eficientă de a administra medicamente intravenoase (IV) care pot rămâne în corp săptămâni sau luni, eliminând necesitatea de a supune venele dumneavoastră la numeroase înțepături necesare în absența PICC-ului. Unele medicamente pot fi potențial dăunătoare pentru peretele venelor mai mici; liniile PICC permit administrarea directă a acestor medicamente în venele mai mari care sunt mai puțin susceptibile de a fi deteriorate.

Cum ar trebui să mă pregătesc înainte de procedură?

Ar trebui să informați medicul cu privire la orice medicamente pe care le luați, orice alergii pe care le aveți și dacă sunteți gravidă. Dacă este necesar, vor fi efectuate analize de sânge relevante.

Procedura


Procedura va fi efectuată în departamentul de radiologie intervențională. Vi se va cere să vă întindeți pe masa de examinare și veți fi conectat la monitoare care vor monitoriza ritmul cardiac, tensiunea arterială și pulsul în timpul procedurii. PICC-ul poate fi inserat în oricare dintre brațe; vi se va cere să întindeți brațul lângă corp, pe un suport. Vena cea mai potrivită este identificată cu ajutorul ecografului și este marcată pe piele.

Se plasează cu lejeritate un garou în jurul brațului. Pielea este curățată cu o soluție de sterilizare, iar zona este acoperită cu câmpuri sterile cu o deschizătură în locul inserției. Garoul va fi strâns apoi pe brațul dumneavoastră, iar cu ajutorul sondei de ecografie, vena potrivită este localizată din nou. Se injectează anestezic local la nivelul pielii și țesuturilor dintre piele și peretele venei. Aceasta este singura parte dureroasă a procedurii. Odată ce senzația de înțepătură a anestezicului dispare, veți simți doar o ușoară presiune. De obicei, nu este necesară administrarea de medicamente pentru ameliorarea durerii prin perfuzie intravenoasă și sedare, dar pot fi administrate dacă este necesar.

Odată ce anestezicul și-a făcut efectul complet, se introduce un ac în venă, prin care se trece un fir ghid subțire. Un tub este introdus peste

firul ghid, prin care PICC-ul este apoi avansat în poziție folosind fluoroscopia (raze X în timp real) pentru a poziționa cateterul exact. Doar rar este necesară injectarea unui lichid (un agent de contrast pe bază de iod) pentru a evidenția venele pe ecran. Odată ce PICC-ul este în poziția corectă, cateterul este verificat pentru a se asigura că se poate recolta sânge și că se poate injecta apă sterilă.

Locul de inserție este curățat, cateterul este acoperit cu un pansament și se aplică un dispozitiv de fixare. Componentele pansamentului includ de obicei un dispozitiv adeziv pentru a-l menține în loc și un pansament transparent care vă permite să vedeți locul de inserție.



Cateter PICC montat

Care sunt riscurile?

Inserțiile de linii PICC au o rată relativ scăzută a complicațiilor. Ocazional, cateterul poate irita peretele venei, cauzând inflamație. Acest lucru devine mai probabil dacă PICC-ul este lăsat în loc pentru o perioadă lungă (2 luni sau mai mult). Orice dispozitiv introdus în sistemul vascular crește riscul formării cheagurilor, fie în vas, fie în cateter, ceea ce ar putea duce la înfundarea parțială sau completă.

Blocarea cateterului este cea mai comună complicație, care poate fi prevenită prin

îngrijire adecvată și de obicei gestionată ușor prin clătire sau, ocazional, prin înlocuirea cu unul nou. Deteriorarea cateterului poate apărea în cazul oricărui PICC, cel mai des din cauza îngrijirii necorespunzătoare. Respectarea instrucțiunilor pentru îngrijirea PICC-ului este esențială pentru prevenirea deteriorării cateterului după inserție.

La ce ar trebui să mă aștept după procedură? Care este planul de urmărire?

Majoritatea pacienților cărora li se montează linii PICC sunt liberi să părăsească spitalul la scurt timp după procedură.

Vi se vor oferi sfaturi cu privire la următoarele aspecte cheie ale îngrijirii:

- Menținerea locului de inserție curat, uscat și acoperit cu un pansament
- Urmarea instrucțiunilor pentru schimbarea pansamentului. De obicei, acest lucru se face săptămânal; totuși, pot fi necesare schimbări mai frecvente ale pansamentului, mai ales dacă pansamentul devine umed, murdar, se desprinde sau nu mai aderă.
- Evitarea ridicării greutăților sau activităților care ar putea slăbi PICC-ul
- Purtați un manșon PICC / tubigrip pentru a preveni agățarea acestuia în obiecte
- Fiți atenți la apariția complicațiilor. În unele situații, este posibil să fie necesar să curățați și să clățiți linia în mod regulat pentru a o menține curată și pentru a evita apariția problemelor. Vi se vor oferi instrucțiuni clare dacă trebuie să faceți acest lucru. Medicul vă va spune cât timp ar trebui să rămână PICC-ul în loc și vă va informa cu privire la planurile pentru îndepărtarea sa.

www.cirse.org/patients

Acest document conține informații medicale generale. Informațiile nu au scopul de a înlocui sfaturile medicale profesionale, diagnosticul sau tratamentul.